

# S-1+ランダ(持続)療法 (Day8)

## 【内科】①-8【胃癌・食道癌・膵癌・胆道癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: <span style="float: right;">cm</span>	体重: <span style="float: right;">kg</span>
体表面積: <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>	Cr: <span style="float: right;">mg/dL</span>

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 5週ごとを1コースとする

Day	1	7	8	9	15	22	29	~35
施行日	/	/	/	/	/	/	/	
エスワン	経口: Day1-21							
ランダ	休薬	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		ソルデム3A 500mL 2時間
②		アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分
③		●ランダ【           】mg 生食 500mL 2時間
④		フロセミド注20mg 0.5A ソルデム3A 500mL 3時間
⑤		ソルデム3A 500mL 6時間 翌日0時まで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	※エスワンの1日投与量
ランダ	60 mg/m <sup>2</sup> mg/Body	<1.25 40mg × 2
エスワン	※参照	1.25-1.5 50mg × 2 1.5 ≤ 60mg × 2

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 腎毒性を予防するため投与日を含む前後日はハイドレーションを行うこと。
- エスワンは3週投与2週休薬
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday9,10,11に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday8,9,10,11に投与する。