

ハーセプチン+ゼローダ+ランダ(持続)療法【90分】(Day2)

■エンボス

【外科】103-2【胃癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |

| | | | |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長: | cm | 体重: | kg |
| 体表面積: | m ² | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

| Day | 1 | 2 | 3 | 16 | ~21 |
|--------|----|----------------------|----|----|-----|
| 施行日 | / | / | / | | |
| ハーセプチン | 休薬 | ↓ | 休薬 | 休薬 | |
| ゼローダ | 休薬 | 経口: Day2(夕)~Day16(朝) | | | |
| ランダ | 休薬 | ↓ | 休薬 | 休薬 | |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | ソルデム3A 500mL 2時間 |
| ② | アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分 |
| ③ | ●ハーセプチン【 】mg 注射用水 20mL 生食 250mL 1時間30分 |
| ④ | ●ランダ【 】mg 生食 500mL 2時間 |
| ⑤ | フロセミド注20mg 0.5A ソルデム3A 500mL 3時間 |
| ⑥ | ソルデム3A 500mL 4時間30分 翌日0時まで |

■投与量

※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 |
|--------|------------------------------|
| ハーセプチン | 6 mg/kg mg/Body |
| ゼローダ | 2000mg/m ² /分2 |
| ランダ | 80 mg/m ² mg/Body |

※ハーセプチンは1コース目の初回のみ8mg/kgで投与

■注意・確認事項

- 腎毒性を予防するため投与日を含む前後日はハイドレーションを行うこと。
- ゼローダは2週投与1週休薬
- ハーセプチンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday3,4,5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday2,3,4,5に投与する。

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |