

# ADOC療法 (Day1)

## 【呼吸器科】104-1【胸腺腫・胸腺癌】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	~21
施行日	/	/	/	/	/
ドキシソルピシン	↓	休薬	休薬	休薬	
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	
オンコビン	休薬	休薬	↓	休薬	
エンドキサン	休薬	休薬	休薬	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②		●ドキシソルピシン【 】mg 生食 100mL 30分
③		生食 50mL 10分
④		KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
⑤		マンニトールS 300mL 30分
⑥		●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間
⑦		KCL注10mEq 生食 500mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ドキシソルピシン	40mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ランダ	50mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
オンコビン	0.6mg/m <sup>2</sup> (MAX 2mg/Body)	mg/Body
エンドキサン	700mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○ドキシソルピシン注の総投与量は500mg/m<sup>2</sup>以下とする。

○心毒性に注意。

○腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。