

ADOC療法 (Day3)

【呼吸器科】104-3【胸腺腫・胸腺癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|----------------------|-----------|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |
| 身長: cm | 体重: kg |
| 体表面積: m ² | Cr: mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

| Day | 1 | 2 | 3 | 4 | ~21 |
|----------|----|----|----|----|-----|
| 施行日 | / | / | / | / | / |
| ドキシソルピシン | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 | |
| ランダ | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 | |
| オンコビン | 休薬 | 休薬 | ↓ | 休薬 | |
| エンドキサン | 休薬 | 休薬 | 休薬 | ↓ | |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | |
|-----|----------------------------------|
| ① | 生食 50mL 10分 |
| ② | ●オンコビン【 】mg 生食 50mL 全開5分 |
| ③ | 生食 50mL 10分 フラッシュ |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 |
|----------|--|
| ドキシソルピシン | 40mg/m ² mg/Body |
| ランダ | 50mg/m ² mg/Body |
| オンコビン | 0.6mg/m ² (MAX 2mg/Body) mg/Body |
| エンドキサン | 700mg/m ² mg/Body |

| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|-----------|-----|-----|
| | | |

■注意・確認事項

○ドキシソルピシン注の総投与量は500mg/m²以下とする。

○心毒性に注意。

○腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。