

# CAMP療法 (Day5,6)

## 【呼吸器科】105-5,6【胸腺腫・胸腺癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

<b>診療科:</b>	<b>病棟:</b>
<b>医師名:</b>	<b>印</b>
<b>身長:</b>	<b>cm</b>
<b>体重:</b>	<b>kg</b>
<b>体表面積:</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>Cr:</b>	<b>mg/dL</b>

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3~4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	~21or28
施行日	/	/	/	/	/	/	
ドキソルビシン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
ランダ	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	
ソル・メドロール1000mg	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	
ソル・メドロール500mg	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		ソル・メドロール注500mg 1V 生食 500mL

1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ドキソルビシン	40 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ランダ	20 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

■注意・確認事項

- ドキソルビシン注の総投与量は500mg/m<sup>2</sup>以下とする。
- 心毒性に注意。
- 腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること。
- イメンドcap125mg(レジメンオーダ)はday1に、  
イメンドcap80mg(内服オーダ)はday2~5に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師