

S-1+ランダ+ハーセプチン(持続)療法【30分】(Day2)

■エンボス

【外科】122-2【胃癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	15	~21
施行日	/	/	/	/	/
エスワン	休薬	経口: Day2-Day15			
ランダ	休薬	↓	休薬	休薬	
ハーセプチン	休薬	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	ソルデム3A 500mL 2時間
②	アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分
③	●ハーセプチン【 】mg 注射用水 20mL 生食 250mL 30分
④	●ランダ【 】mg 生食 500mL 2時間
⑤	フロセミド注20mg 0.5A ソルデム3A 500mL 3時間
⑥	ソルデム3A 500mL 5時間30分 翌日0時まで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
エスワン	※参照
ランダ	60 mg/m ² mg/Body
ハーセプチン	6 mg/kg mg/Body

※エスワンの1日投与量
BSA<1.25 80mg/日
1.25≤BSA<1.5 100mg/日
1.5≤BSA 120mg/日

※ハーセプチンは1コース目の初回のみ8mg/kgで投与

■注意・確認事項

- 腎毒性を予防するため投与日を含む前後日はハイドレーションを行うこと。
- エスワンは2週連日投与、1週休薬。
- ハーセプチンは初回投与の忍容性が良好(infusion reaction等が発生していない)であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday3,4,5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday2,3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師