

[short hydration(適応:75歳未満)]

■エンボス

## S-1+ランダ(SH)療法

### 【外科】127【胃癌・膵癌・胆道癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 5週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	29	~35
施行日	/	/	/	/	/	
エスワン	経口:Day1-Day21					
ランダ	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分
②	KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
③	マンニトールS 300mL 30分
④	●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間
⑤	KCL注10mEq 生食 500mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	※エスワンの1日投与量	
ランダ	60 mg/m <sup>2</sup> mg/Body	<1.25	40mg×2
エスワン	※参照	1.25-1.5	50mg×2
		1.5≧	60mg×2

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○75歳未満の患者を対象とする。

○エスワンは3週投与2週休薬

○腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday9,10,11に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday8,9,10,11に投与する。