

[short hydration(適応:75歳未満)]

■エンボス

**ゼローダ+ランダ(SH)療法**

**【外科】128【胃癌】  
(第 コース目)**

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
ゼローダ	経口:連日 Day1(夕)-Day15(朝)			
ランダ		休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分
②	KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
③	マンニトールS 300mL 30分
④	●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間
⑤	KCL注10mEq 生食 500mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ランダ	80mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ゼローダ	2000mg/m <sup>2</sup>	

■注意・確認事項

- 75歳未満の患者を対象とする。
- ゼローダは2週投与1週休薬。
- 腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師