

[short hydration(適応:75歳未満)]

■エンボス

ハーセプチン+ゼローダ+ランダ(SH)療法【90分】

**【外科】129【胃癌】
(第 コース目)**

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
ハーセプチン	↓	休薬	休薬	
ゼローダ	経口:Day1(夕)~Day15(朝)			
ランダ	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分
②		●ハーセプチン【 】mg 注射用水 20mL 生食 250mL 1時間30分
③		KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
④		マンニトールS 300mL 30分
⑤		●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間
⑥		KCL注10mEq 生食 500mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ハーセプチン	6 mg/kg mg/Body
ゼローダ	2000mg/m ² /分2
ランダ	80 mg/m ² mg/Body

※ハーセプチンは1コース目の初回のみ8mg/kgで投与

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 75歳未満の患者を対象とする。
- ゼローダは2週投与1週休薬
- 腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。
- ハーセプチンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。