

FP+アービタックス療法【Day2,3】

【歯科】⑬-2,3【頭頸部癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項


診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
アービタックス	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アービタックス(初回)	400mg/m ² /day
アービタックス(2回目以降)	250mg/m ² /day
ランダ	100mg/m ² /day
5-FU	1000mg/m ² /day

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。5-FU投与時は輸液ポンプを使用すること。
- 腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること
- アービタックス投与中又は24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- アービタックスは1コース目の初回のみ400mg/m²で投与。それ以降は250mg/m²で投与。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。