

# カルボプラチン+ペブシド療法 (Day1)

## 【呼吸器科】⑬-1【小細胞肺癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3~4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	~21or 28
施行日	/	/	/	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	
ペブシド	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順			
①	<table border="1"> <tr> <td>アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトンバッグ 100mL</td> <td>30分</td> </tr> </table>	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトンバッグ 100mL	30分
アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトンバッグ 100mL	30分		
②	<table border="1"> <tr> <td>●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL</td> <td>1時間</td> </tr> </table>	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL	1時間
●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL	1時間		
③	<table border="1"> <tr> <td>●ペブシド【 】mg 生食 500mL</td> <td>1時間30分</td> </tr> </table>	●ペブシド【 】mg 生食 500mL	1時間30分
●ペブシド【 】mg 生食 500mL	1時間30分		
④	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分フラッシュ
生食 50mL	10分フラッシュ		

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
カルボプラチン	AUC=5	mg/Body
ペブシド	80 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師