

EC(100)療法

【外科】141【乳癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
エピルビシン	↓	休薬	休薬	
エンドキサン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分
②	●エピルビシン【 】mg 5分 生食 50mL (全開)
③	生食 50mL 全開
④	●エンドキサン【 】mg 30分 生食 100mL
⑤	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
エピルビシン	100 mg/m ²	mg/Body
エンドキサン	500 mg/m ²	mg/Body

※エピルビシンの総投与量に留意すること。
(エピルビシンとして800mg/m²以上で心機能異常の危険性)

■注意・確認事項

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師