

■エンボス

# SOX+アービタックス療法【2コース目以降:Day1】

## 【外科】166-1【進行性・再発大腸癌】

### (第    コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長:	cm
体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>
Cr:	mg/dL

■ **レジメン** 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
アービタックス	↓	↓	↓	
エルプラット		休薬	休薬	
エスワン	経口: Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順			
①		アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A ポララミン注5mg 1A グラニセトンバッグ 100mL	30分
②		●アービタックス (    )mg 生食 250mL	1時間
③		生食 100mL	30分
④		●エルプラット注 (    )mg 5%ブドウ糖 500mL デキサート注1.65mg 1A	2時間
⑤		生食 50mL	10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
アービタックス(初回)	400mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
アービタックス(2回目以降)	250mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
エルプラット注	130 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
エスワン	※投与量の参考	

※エスワンの1日投与量

<1.25	80mg/Body/分2
1.25- $<$ 1.5	100mg/Body/分2
1.5 $\leq$	120mg/Body/分2

■注意・確認事項

- エスワンは2週投与1週休薬。
- アービタックス投与中又は24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- アービタックスは1コース目の初回のみ400mg/m<sup>2</sup>で投与。それ以降は250mg/m<sup>2</sup>で投与。
- エルプラットは塩化物・塩基性溶液との混和は不可

入力 薬剤師	看護師	看護師