

Avastin + 5FU/LV療法 (FOLFOXIRI後維持療法)

【外科】173【進行性・再発大腸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	~14
施行日	/	/	/	/	/
アバステン	↓	休薬	休薬	休薬	
アイソボリン	↓	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	デキサート注6.6mg 1V 5%ブドウ糖 100mL 10分
②	●アバステン注【 】mg 生食 100mL 30分
③	●アイソボリン注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 2時間
④	生食 50mL 10分フラッシュ
⑤	●5-FU注【 】mg 5%ブドウ糖 120mL 約48時間 baxter infusion pumpで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アバステン注	5mg/kg
アイソボリン注	200 mg/m ² mg/Body
5-FU注	3200 mg/m ² mg/Body

入力薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。
- アバステンとブドウ糖溶液を混合した場合、アバステン(ベバシズマブ)の力価の減弱が生じるおそれがあるため、ブドウ糖溶液との混合を避け、アバステンとブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。
- アバステン投与に関して30分投与の忍容性が確立されていることを確認すること。