

mXELIRI療法

【外科】180【進行性・再発大腸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール：3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
カンプト	↓	休薬	休薬	休薬
ゼローダ	経口:Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトンバッグ 100mL 30分
②	●カンプト注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間30分
③	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
カンプト注	200 mg/m ²	mg/Body
ゼローダ錠	1600 mg/m ² /分2	mg/Body

※UGT1A1の遺伝子多型を有する場合の開始量は150mg/m²

※ゼローダ錠は2週間連日投与後、1週間休薬。投与量注意。

■注意・確認事項

○カンプトは腸閉塞患者には禁忌。

入力 薬剤師	看護師	看護師