

5FU/LV+ベクティビックス療法

【外科】184【進行性・再発大腸癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	~14
施行日	/	/	/	/	
ベクティビックス	↓	休薬	休薬	休薬	
アイソボリン	↓	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	デキサート注6.6mg 1V ポラミン注5mg 1A 5%ブドウ糖 100mL 10分
②	生食 50mL 10分
③	●ベクティビックス注【 】mg 生食 100mL 1時間
④	生食 50mL 10分
⑤	●アイソボリン注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 2時間
⑥	●①5-FU注【 】mg 生食 50mL 3分
⑦	生食 50mL 10分フラッシュ
⑧	●②5-FU注【 】mg 5%ブドウ糖 120mL 約46時間baxtar infusion pumpで

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ベクティビックス	6mg/kg	
アイソボリン注	200 mg/m ²	mg/Body
①5-FU注	400 mg/m ²	mg/Body
②5-FU注	2400 mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- RAS遺伝子野生型であることを確認のうえ、オーダーすること。

入力 薬剤師	看護師	看護師