

SIRB療法【60分】

【外科】200【進行性・再発大腸癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
エスワン	経口: Day1-Day14			
アバスチン	↓	休薬	休薬	
カンプト	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	●アバスチン注【 】mg 生食 100mL 1時間
③	●カンプト注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間30分
④	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
エスワン	80mg/m ² /day
アバスチン注	7.5mg/kg
カンプト注	150 mg/m ² mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- カンプトは腸閉塞患者には禁忌。
- アバスチンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。
2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
- アバスチンとブドウ糖溶液を混合した場合、アバスチン(ベバシズマブ)の力価の減弱が生じるおそれがあるため、ブドウ糖溶液との混合を避け、アバスチンとブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。