

エンハーツ療法【30分】

【外科】213【胃癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
エンハーツ	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL </div> 30分
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 5%ブドウ糖 100mL </div> 10分
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ●エンハーツ【 】mg 注射用水 20mL 5%ブドウ糖 100mL </div> 30分
④	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 5%ブドウ糖 100mL </div> 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
エンハーツ	6.4 mg/kg mg/Body

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 点滴バッグは遮光すること。
- 定期的に関質性肺炎の検査を実施すること。
- 定期的に関機能検査を実施すること。
- エンハーツは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

入力 薬剤師	看護師	看護師