

キイトルーダ+ジェムザール+カルボプラチン療法(Day8)

【外科】224-8【乳癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
キイトルーダ	↓	休薬	休薬	
ジェムザール	↓	↓	休薬	
カルボプラチン	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②	●ジェムザール【 】mg 生食 100mL 30分
③	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間
④	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
キイトルーダ	200mg/Body	
ジェムザール	1000 mg/m ²	mg/Body
カルボプラチン	AUC=2	mg/Body

■注意・確認事項

○ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)

○必要に応じてデカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,9,10に経口投与する。

薬剤師	看護師	看護師