

# パージェタ+ハーセプチン療法【2コース目～】

## 【外科】232【進行性・再発大腸癌】

### (第 コース目)

■エンボス

\*網かけ部分は必須記入事項

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 診療科:                 | 病棟:       |
| 医師名:                 | 印         |
| 身長: cm               | 体重: kg    |
| 体表面積: m <sup>2</sup> | Cr: mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

|        |   |    |    |     |
|--------|---|----|----|-----|
| Day    | 1 | 8  | 15 | ~21 |
| 施行日    | / | /  | /  |     |
| パージェタ  | ↓ | 休薬 | 休薬 |     |
| ハーセプチン | ↓ | 休薬 | 休薬 |     |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 |   |
|-----|---|
| ①   | デキサート注6.6mg 1V<br>生食 50mL 10分             |
| ②   | ●パージェタ【 】mg<br>生食 250mL 30分               |
| ③   | ●ハーセプチン【 】mg<br>注射用水 20mL<br>生食 250mL 30分 |
| ④   | 生食 50mL 10分 フラッシュ                         |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名    | 標準投与量           |                          |
|--------|-----------------|--------------------------|
| パージェタ  | 420mg/Body      | ※パージェタは1コース目のみ840mgで投与   |
| ハーセプチン | 6 mg/kg mg/Body | ※ハーセプチンは1コース目のみ8mg/kgで投与 |

■注意・確認事項

○パージェタ、ハーセプチンは忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分に短縮可能。

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|           |     |     |