

TCHP療法【初回】

【外科】248【乳癌】 （第 コース目）

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |

| | | | |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長: | cm | 体重: | kg |
| 体表面積: | m ² | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

| Day | 1 | 8 | 15 | ~21 |
|---------|---|----|----|-----|
| 施行日 | / | / | / | |
| パージェタ | ↓ | 休薬 | 休薬 | |
| ハーセプチン | ↓ | 休薬 | 休薬 | |
| ドセタキセル | ↓ | 休薬 | 休薬 | |
| カルボプラチン | ↓ | 休薬 | 休薬 | |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | | |
|-----|---|----------|
| ① | デキサート注6.6mg 1V 生食 50mL | 10分 |
| ② | ●パージェタ【 】mg 生食 250mL | 1時間 |
| ③ | ●ハーセプチン【 】mg 注射用水 20mL 生食 250mL | 1時間30分 |
| ④ | アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトロンバッグ 100mL | 30分 |
| ⑤ | ●ドセタキセル【 】mg 5%ブドウ糖 250mL | 1時間 |
| ⑥ | ●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖 250mL | 1時間 |
| ⑦ | 生食 50mL | 10分フラッシュ |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 | |
|---------|----------------------|------------|
| パージェタ | | 840mg/Body |
| ハーセプチン | 8 mg/kg | mg/Body |
| ドセタキセル | 75 mg/m ² | mg/Body |
| カルボプラチン | AUC=6 | mg/Body |

※パージェタは1コース目のみ840mgで投与
※ハーセプチンは1コース目のみ8mg/kgで投与

■注意・確認事項

○パージェタ、ハーセプチンは忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分に短縮可能。

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |