

ランダ+ベプシド療法(Day2,3)

【呼吸器科】27-2,3【小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|----------------------|-----------|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |
| 身長: cm | 体重: kg |
| 体表面積: m ² | Cr: mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3~4週ごとを1コースとする

| Day | 1 | 2 | 3 | ~21or28 |
|------|---|----|----|---------|
| 施行日 | / | / | / | |
| ランダ | ↓ | 休薬 | 休薬 | |
| ベプシド | ↓ | ↓ | ↓ | |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | |
|-----|-------------------------------|
| ① | 生食 100mL 30分 |
| ② | ●ベプシド【 】mg 生食 500mL 1時間30分 |
| ③ | ソルデム3A 500mL 1時間30分 |
| ④ | ソルデム3A 500mL 1時間30分 |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 | |
|------|-----------------------|---------|
| ランダ | 80 mg/m ² | mg/Body |
| ベプシド | 100 mg/m ² | mg/Body |

■注意・確認事項

○ベプシド注は投与量が200mg(0.4mg/mL)を超えると結晶が析出することがある。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |