

アイエーコール動注(持続)療法 (Day2)

【内科】29-2【肝細胞癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	~28
施行日	/	/	/	
アイエーコール	休薬	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	【末梢ルート】	【肝動注】
①	ソルデム3A 500mL 2時間	
②	アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 30分	
※③	フロセミド注20mg 1A ソルデム3A 500mL 5時間	← 肝動注 ●動注用アイエーコール【 】mg 生食 100mL 1時間
④	ソルデム3A 500mL 6時間 翌日0時まで	

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アイエーコール	65 mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○アイエーコール投与前に結晶が析出していないかを確認すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday3,4,5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday2,3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師