

# BEP療法 (Day3,4,5)

## 【婦人科】31-3,4,5【卵巣癌】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	9	16	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ベプシド	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ランダ	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ブレオ	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 10分
②	●ベプシド【 】mg 生食 500mL 1時間
③	KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
④	マンニトールS 300mL 30分
⑤	●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間
⑥	KCL注10mEq 生食 500mL 1時間
⑦	ヘパリンNaロックシリンジ 10単位

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ベプシド	100 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ランダ	20 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ブレオ	mg/m <sup>2</sup>	30mg/Body

■注意・確認事項

●上記の標準レジメンの投与スケジュールは、腎機能に応じて副作用低減のため、点滴(ハイドレーション)を増量することがあります。指示書に従って投与して下さい。

○イメンドcap125mg(レジメンオーダ)はday1に、  
イメンドcap80mg(内服オーダ)はday2~5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師