

# CVD療法(Day2)

## 【泌尿器科】33-2【悪性褐色細胞腫】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項


|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 診療科:                                      | 病棟: |
| 医師名: <span style="float: right;">印</span> |     |

|                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 身長: <span style="float: right;">cm</span>              | 体重: <span style="float: right;">kg</span>    |
| 体表面積: <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span> | Cr: <span style="float: right;">mg/dL</span> |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

|        |   |    |     |
|--------|---|----|-----|
| Day    | 1 | 2  | ~21 |
| 施行日    | / | /  |     |
| ダカルバジン | ↓ | ↓  |     |
| エンドキサン | ↓ | 休薬 |     |
| オンコビン  | ↓ | 休薬 |     |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名    | 標準投与量                                  |         |
|--------|----------------------------------------|---------|
| ダカルバジン | 600mg/m <sup>2</sup>                   | mg/Body |
| エンドキサン | 750mg/m <sup>2</sup>                   | mg/Body |
| オンコビン  | 1.4mg/m <sup>2</sup><br>(MAX 2mg/Body) | mg/Body |

|           |     |     |  |
|-----------|-----|-----|--|
| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |  |
|           |     |     |  |

■注意・確認事項

○ダカルバジンは光による分解物で血管痛が惹起される為、点滴バッグを遮光袋に入れ投与時はベッドをカーテンで覆い遮光の対応をとること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。