

ランダ+RT療法 (Day2~5)

【泌尿器科】41-2~5【膀胱癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	~21
施行日	/	/	/	/	/	
ランダ	↓	↓	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	デキサート注6.6mg 1V ソルテム3A 500mL 1時間30分
②	●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間30分
③	フロセミド注20mg 1A 生食 500mL 1時間30分
④	ソルテム3A 500mL 1時間30分
⑤	ヘパリンNaロックシリンジ 10単位

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ランダ	mg/m ²	20mg/Body

■注意・確認事項

- イメンドcap125mg(レジメンオーダ)はday1に、イメンドcap80mg(内服オーダ)はday2~5に投与する。
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師