

# GEM+CDDP療法(Day1,8,15)

## 【泌尿器科】⑤-1,8,15【尿路上皮癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	
ジェムザール	↓	休薬	休薬	↓	↓	
ランダ	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     デキサート注6.6mg 1V                      生食 100mL                 </div> 30分
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     ●ジェムザール【      】mg                      生食 100mL                 </div> 30分
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     生食 50mL                 </div> 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ジェムザール	1000 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ランダ	70 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

■注意・確認事項

○腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday3,4,5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday2,3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師