

# mFOLFIRINOX療法

## 【内科】52【膵癌】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 診療科:                 | 病棟:       |
| 医師名:                 | 印         |
| 身長: cm               | 体重: kg    |
| 体表面積: m <sup>2</sup> | Cr: mg/dL |

### ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

| Day    | 1 | 2  | 8  | 9  | ~14 |
|--------|---|----|----|----|-----|
| 施行日    | / | /  | /  | /  |     |
| エルプラット | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 |     |
| アイソボリン | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 |     |
| カンプト   | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 |     |
| 5-FU   | ↓ | ↓  | 休薬 | 休薬 |     |

### ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 |  |
|-----|--|
| ①   | アロカリス注235mg 1V<br>パロノセトロン注0.75mg 1V<br>デキサート注1.65mg 2A<br>デキサート注6.6mg 1V<br>5%ブドウ糖 100mL 30分 |
| ②   | ●エルプラット注【 】mg<br>5%ブドウ糖 250mL 2時間  |
| ※③  | 生食 100mL 30分   |
| ※③  | 同時 側管より ●アイソボリン注【 】mg<br>5%ブドウ糖 250mL 2時間  |
| ④   | ●カンプト注【 】mg<br>5%ブドウ糖 250mL 1時間30分   |
| ⑤   | 生食 50mL 10分フラッシュ   |
| ⑥   | ●5-FU注【 】mg<br>5%ブドウ糖 120mL 約46時間baxtar infusion pumpで                                       |

### ■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名     | 標準投与量                  |         |
|---------|------------------------|---------|
| エルプラット注 | 85 mg/m <sup>2</sup>   | mg/Body |
| アイソボリン注 | 200 mg/m <sup>2</sup>  | mg/Body |
| カンプト注   | 150 mg/m <sup>2</sup>  | mg/Body |
| 5-FU注   | 2400 mg/m <sup>2</sup> | mg/Body |

### ■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。
- エルプラットは塩化物・塩基性溶液との混和は不可
- カンプトは腸閉塞患者には禁忌。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 入力<br>薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
|           |     |     |