

ジェムザール(3週間毎投与)療法

【外科】⑤②【膵癌・胆道癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
ジェムザール	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順					
①	<table border="1"> <tr> <td>デキサート注6.6mg 1V</td> <td>30分</td> </tr> <tr> <td>生食 100mL</td> <td></td> </tr> </table>	デキサート注6.6mg 1V	30分	生食 100mL	
デキサート注6.6mg 1V	30分				
生食 100mL					
②	<table border="1"> <tr> <td>●ジェムザール【 】mg</td> <td>30分</td> </tr> <tr> <td>生食 100mL</td> <td></td> </tr> </table>	●ジェムザール【 】mg	30分	生食 100mL	
●ジェムザール【 】mg	30分				
生食 100mL					
③	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分フラッシュ		
生食 50mL	10分フラッシュ				

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ジェムザール	1000 mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

○ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)

入力 薬剤師	看護師	看護師