

SOX+ベクティビックス療法

【内科】55【進行性・再発大腸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
ベクティビックス	↓	休薬	休薬	休薬
エルプラット	↓	休薬	休薬	休薬
エスワン	経口: Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A ポララミン注5mg 1A グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	↓ 生食 50mL 10分
③	●ベクティビックス注【 】mg ↓ 生食 100mL 1時間
④	↓ 生食 50mL 10分
⑤	●エルプラット注【 】mg ↓ デキサート注1.65mg 1A 5%ブドウ糖 500mL 2時間
⑥	↓ 生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	※エスワンの1日投与量
ベクティビックス注	6mg/kg	<1.25 80mg/Body/分2
エルプラット注	130 mg/m ² mg/Body	1.25~<1.5 100mg/Body/分2
エスワン	※投与量の参考	1.5≦ 120mg/Body/分2

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- エスワンは2週投与1週休薬。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- エルプラット注は塩化物・塩基性溶液との混和は不可。
- ORAS遺伝子野生型であることを確認のうえ、オーダーすること。