

[short hydration(適応:75歳未満)]

■エンボス

ランダ+ドセタキセル+RT(SH)療法

【呼吸器科】58【非小細胞肺癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	~28
施行日	/	/	/	/	/
ランダ	↓	↓	休薬	休薬	
ドセタキセル	↓	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②		●ドセタキセル ()mg 5%ブドウ糖液 250mL 1時間
③		KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
④		マンニトールS 300mL 30分
⑤		●ランダ ()mg 生食 500mL 1時間
⑥		KCL注10mEq 生食 500mL 1時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ランダ	40mg/m ²	mg/Body
ドセタキセル	40mg/m ²	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○75歳未満の患者を対象とする。

○腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4,9,10,11に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4,8,9,10,11に投与する。