

BEP療法 (Day6,7)

【泌尿器科】⑥-6,7【精巣癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	7	9	16	~21
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ベプシド	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ランダ	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ブレオ	休薬	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> デキサート注6.6mg 1V ソルデム3A 500mL </div> 1時間30分	
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ソルデム3A 500mL </div> 1時間30分	
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ソルデム3A 500mL </div> 1時間30分	

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ベプシド	100 mg/m ²	mg/Body
ランダ	20 mg/m ²	mg/Body
ブレオ	mg/m ²	30mg/Body

■注意・確認事項
 ●上記の標準レジメンの投与スケジュールは、腎機能に応じて副作用低減のため、点滴(ハイドレーション)を増量することがあります。指示書に従って投与して下さい。

入力 薬剤師	看護師	看護師