

【2回目】テセントリク+Avastin

【内科】60【肝細胞癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
テセントリク	↓	休薬	休薬	
アバステン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●テセントリク【 】mg 生食 250mL 30分
③	生食 50mL 10分
④	●アバステン【 】mg 生食 100mL 1時間
⑤	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
テセントリク	1200mg/body
アバステン	15 mg/kg

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- テセントリクは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- アバステンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。
- 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。