

ジェムザール+ドセタキセル療法 (Day1)

【婦人科】60-1【子宮肉腫】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
ジェムザール	↓	↓	休薬	
ドセタキセル	休薬	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> デキサート注6.6mg 1A 生食 100mL </div> <div style="text-align: right;">30分</div>
②	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ●ジェムザール【 】mg 生食 100mL </div> <div style="text-align: right;">30分</div>
③	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 生食 50mL </div> <div style="text-align: right;">10分フラッシュ</div>

■投与量

※投与量の参考

薬剤	標準投与量	
ジェムザール	900mg/m ²	mg/Body
ドセタキセル	70mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

○ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)

入力 薬剤師	看護師	看護師