

# ジェムザール+ドセタキセル療法 (Day8)

## 【婦人科】60-8【子宮肉腫】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
ジェムザール	↓	↓	休薬	
ドセタキセル	休薬	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②	●ジェムザール ( ) mg 生食 100mL 30分
③	●ドセタキセル ( ) mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間
④	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤	標準投与量	
ジェムザール	900mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

■注意・確認事項  
 ○ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)

入力 薬剤師	看護師	看護師