

Avastin+ジェムザール+カルボプラチン療法【90分】

【婦人科】63-1【卵巣癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
アバステン	↓	休薬	休薬	
ジェムザール	↓	↓	休薬	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	●アバステン【 】mg 生食 100mL 1時間30分
③	生食 50mL 10分
④	●ジェムザール【 】mg 生食 100mL 30分
⑤	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖液 250mL 1時間
⑥	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アバステン	15 mg/kg
ジェムザール	1000 mg/m ² mg/Body
カルボプラチン	AUC=4

■注意・確認事項

- ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)
- アバステンは初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。
2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とすることができる。
- アバステンとブドウ糖溶液を混合した場合、アバステンの力価の減弱が生じるおそれがあるため、
ブドウ糖溶液との混合を避け、アバステンとブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。
- 投与期間は10コースを目途とし、以降は維持療法を検討する。

薬剤師	看護師	看護師