

■エンボン

# Avastin+ジェムザール+カルボプラチン療法【60分】

## 【婦人科】64-8【卵巣癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
アバステン	↓	休薬	休薬	
ジェムザール	↓	↓	休薬	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     デキサート注6.6mg 1V                      生食 100mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">30分</div>
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     ●ジェムザール【      】mg                      生食 100mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">30分</div>
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     生食 50mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">10分 フラッシュ</div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アバステン	15 mg/kg
ジェムザール	1000 mg/m <sup>2</sup> mg/Body
カルボプラチン	AUC=4

■注意・確認事項

- ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)
- 投与期間は10コースを目途とし、以降は維持療法を検討する。

薬剤師	看護師	看護師