

ジェムザール+カルボプラチン療法

【婦人科】66-1【卵巣癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
ジェムザール	↓	↓	休薬	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A グラニセトンバッグ 100mL 30分
②	●ジェムザール【 】mg 生食 100mL 30分
③	●カルボプラチン【 】mg 5%ブドウ糖液 250mL 1時間
④	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ジェムザール	1000 mg/m ² mg/Body
カルボプラチン	AUC=4

■注意・確認事項

- ジェムザール投与は30分前後で投与する。(60分以上かかると副作用が増強した例が報告されている。)
- 投与期間は10コースを目途とし、以降は維持療法を検討する。

薬剤師	看護師	看護師