

Avastin+リムパーザ療法【30分】

【婦人科】70【卵巣癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
アバステン	↓	休薬	休薬	
リムパーザ	経口:連日投与			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●アバステン注【 】mg 生食 100mL 30分
③	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
アバステン注	15mg/kg	mg/Body
リムパーザ		600mg/Body

■注意・確認事項

- 本レジメンは一次治療終了後の維持療法で使用する。
- アバステンとブドウ糖溶液を混合した場合、アバステンの力価の減弱が生じるおそれがあるため、ブドウ糖溶液との混合を避け、アバステンとブドウ糖溶液の同じ点滴ラインを用いた同時投与は行わないこと。
- アバステン投与に関して30分投与の忍容性が確立されていることを確認すること。
- 本レジメンは最長15ヶ月継続し、リムパーザは最長24ヶ月まで継続する。

入力 薬剤師	看護師	看護師