

ビラフトビ+メクトビ+アービタックス療法【1コース目】

■エンボス

【内科】71【進行性・再発大腸癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 1週ごとを1コースとする

Day	1	~7
施行日	/	
アービタックス	↓	
ビラフトビ	経口:連日投与	
メクトビ	経口:連日投与	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		ポララミン注5mg 1A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
②		●アービタックス【 】mg 生食 250mL 2時間
③		生食 100mL 30分

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
アービタックス(初回)	400mg/m ²	mg/Body
アービタックス(2回目以降)	250mg/m ²	mg/Body
ビラフトビ	300mg/回 1日1回	
メクトビ	45mg/回 1日2回	

■注意・確認事項

- アービタックス投与中又は24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。
- アービタックスは1コース目の初回のみ400mg/m²で投与。それ以降は250mg/m²で投与。
- 大腸癌組織でのBRAF遺伝子変異を認める症例に使用すること。
- 2nd line 以降に使用すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師