

XELOX+ベクティビックス療法

【内科】79【進行性・再発大腸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |

| | | | |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長: | cm | 体重: | kg |
| 体表面積: | m ² | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

| | | | | |
|----------|----------------------|----|----|-----|
| Day | 1 | 8 | 15 | ~21 |
| 施行日 | / | / | / | / |
| ベクティビックス | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 |
| エルプラット | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 |
| ゼローダ | 経口: Day1(夕)~Day15(朝) | | | |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | |
|-----|---|
| ① | アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A ポラミン注5mg 1A グラニセトンバッグ 100mL 30分 |
| ② | 生食 50mL 10分 |
| ③ | ●ベクティビックス注【 】mg 生食 100mL 1時間 |
| ④ | 生食 50mL 10分 |
| ⑤ | ●エルプラット注【 】mg 5%ブドウ糖 500mL デキサート注1.65mg 1A 2時間 |
| ⑥ | 生食 50mL 10分 フラッシュ |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 |
|----------|------------------------------------|
| ベクティビックス | 6mg/kg |
| エルプラット注 | 130 mg/m ² mg/Body |
| ゼローダ錠 | 2000 mg/m ² /分2 mg/Body |

※ゼローダ錠は2週間連日投与後、1週間休薬。

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- RAS遺伝子野生型であることを確認のうえ、オーダーすること。
- エルプラット注は塩化物・塩基性溶液との混和は不可。

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 入力 薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |