

# XELOX療法

## 【外科】84【進行性・再発大腸癌、胃癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	/
エルプラット	↓	休薬	休薬	休薬
ゼローダ	経口: Day1(夕)~Day15(朝)			

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
①		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     アロカリス注235mg 1V                      デキサート注1.65mg 2A                      グラニセトロンバッグ 100mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">30分</div>
②		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     ●エルプラット注【           】mg                      5%ブドウ糖 500mL                      デキサート注1.65mg 1A                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">2時間</div>
③		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     生食 50mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">10分 フラッシュ</div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
エルプラット注	130 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
ゼローダ錠	2000 mg/m <sup>2</sup> /分2	mg/Body

※ゼローダ錠は2週間連日投与後、1週間休薬。

■注意・確認事項

○エルプラット注は塩化物・塩基性溶液との混和は不可。

入力 薬剤師	看護師	看護師