

[short hydration(適応:75歳未満)]

■エンボス

Weeklyランダ(SH)+RT療法

【婦人科】87【子宮頸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 基本的に毎週1回

Day	1	8	15	22	29	36
施行日	/	/	/	/	/	/
ランダ	↓	↓	↓	↓	↓	↓

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL </div> <div style="text-align: right;">30分</div>
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> KCL注10mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL </div> <div style="text-align: right;">1時間</div>
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> マンニトールS 300mL </div> <div style="text-align: right;">30分</div>
④	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ●ランダ【 】mg 生食 500mL </div> <div style="text-align: right;">1時間</div>
⑤	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> KCL注10mEq 生食 500mL </div> <div style="text-align: right;">1時間</div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ランダ	40 mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- 75歳未満の患者を対象とする。
- 腎機能に応じて、副作用軽減のために点滴を追加すること。

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)は

day2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30,31,32,37,38,39に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)を

day1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31,32,36,37,38,39に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師