

イミフィンジ+ジェムザール療法 (Day1)

【内科】88-1【胆道癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
イミフィンジ	↓	休薬	休薬	
ジェムザール	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 50mL 10分
②	●イミフィンジ【 】mg 生食 100mL 1時間
③	生食 50mL 10分
④	デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
⑤	●ジェムザール【 】mg 生食 100mL 30分
⑥	生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
イミフィンジ	1500mg/Body
ジェムザール	1000 mg/m ² mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 体重30kg以下の場合、イミフィンジの1回投与量は20mg/kgとする。