

# FOLFIRI+ベクティビックス療法

## 【外科】90【進行性・再発大腸癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

<b>診療科:</b>	<b>病棟:</b>
<b>医師名:</b>	<b>印</b>
<b>身長:</b>	<b>cm</b>
<b>体重:</b>	<b>kg</b>
<b>体表面積:</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>Cr:</b>	<b>mg/dL</b>

**レシメン** 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	~14
施行日	/	/	/	/	/
ベクティビックス	↓	休薬	休薬	休薬	休薬
カンプト	↓	休薬	休薬	休薬	休薬
アイソボリン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬
5-FU	↓	↓	休薬	休薬	休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     アロカリス注235mg 1V                      デキサート注1.65mg 2A                      ポララミン注5mg 1A                      グラニセトロンバッグ 100mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">30分</div>
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     生食 50mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">10分</div>
③	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     ●ベクティビックス注【      】mg                      生食 100mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">1時間</div>
④	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     生食 50mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">10分</div>
※⑤	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     ●カンプト注【      】mg                      5%ブドウ糖 250mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">2時間</div>
※⑤	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     ●アイソボリン注【      】mg                      5%ブドウ糖 250mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">2時間</div> <p style="font-size: small; margin-left: 20px;">同時に側管より</p>
⑥	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     ●①5-FU注【      】mg                      生食 50mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">3分</div>
⑦	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     生食 50mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">10分フラッシュ</div>
⑧	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     ●②5-FU注【      】mg                      5%ブドウ糖 120mL                 </div> <div style="text-align: right; margin-right: 10px;">約46時間baxter infusion pumpで</div>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ベクティビックス	6mg/kg	mg/Body
カンプト注	150 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
アイソボリン注	200 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
①5-FU注	400 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
②5-FU注	2400 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。
- カンプトは腸閉塞患者には禁忌。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- RAS遺伝子野生型であることを確認のうえ、オーダーすること。

入力 薬剤師	看護師	看護師