

カンプト+ベクティビックス療法

【外科】91【進行性・再発大腸癌】 (第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	~14
施行日	/	/	/	/	
ベクティビックス	↓	休薬	休薬	休薬	
カンプト	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A ポララミン注5mg 1A グラニセトロンバッグ 100mL 30分
②	↓ 生食 50mL 10分
③	↓ ●ベクティビックス注【 】mg 生食 100mL 1時間
④	↓ 生食 50mL 10分
⑤	↓ ●カンプト注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL 1時間30分
⑥	↓ 生食 50mL 10分フラッシュ

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ベクティビックス	6mg/kg	mg/Body
カンプト注	150 ng/m ²	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- カンプトは腸閉塞患者には禁忌。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ORAS遺伝子野生型であることを確認のうえ、オーダすること。