

リブタヨ療法

【婦人科】91【子宮頸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

| | |
|------|-----|
| 診療科: | 病棟: |
| 医師名: | 印 |

| | | | |
|-------|----------------|-----|-------|
| 身長: | cm | 体重: | kg |
| 体表面積: | m ² | Cr: | mg/dL |

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

| | | | | |
|------|---|----|----|-----|
| Day | 1 | 8 | 15 | ~21 |
| 施行日 | / | / | / | / |
| リブタヨ | ↓ | 休薬 | 休薬 | 休薬 |

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

| 滴下順 | |
|-----|---------------------------------|
| ① | 生食 50mL 10分 |
| ② | ●リブタヨ【 】mg 生食 100mL 30分 |
| ③ | 生食 50mL 10分フラッシュ |

■投与量 ※投与量の参考

| 薬剤名 | 標準投与量 |
|-------|------------|
| リブタヨ注 | 350mg/body |

■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- 外来から初回導入となる場合は、インフュージョンリアクションの観察の為、点滴終了1時間後に医師の診察を受け、帰宅の許可を得ること。
- リブタヨの血管外漏出時は、非炎症性抗がん剤としてマニュアルに沿った対応をすること。

| | | |
|-------|-----|-----|
| 入力薬剤師 | 看護師 | 看護師 |
| | | |