

# アービタックス＋Weeklyカンプト療法【1コース目:Day1】

■エンボス

## 【外科】96-1【進行・再発大腸癌】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 6週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	22	29	36	~42
施行日	/	/	/	/	/	/	
アービタックス カンプト	↓	↓	↓	↓	↓	休薬	休薬

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	アロカリス注235mg 1V デキサート注1.65mg 2A ポララミン注5mg 1A 生食 100mL <span style="float:right">30分</span>
②	●アービタックス【 】mg 生食 250mL <span style="float:right">2時間</span>
③	グラニセトンバッグ 100mL <span style="float:right">30分</span>
④	●カンプト【 】mg 5%ブドウ糖液 250mL <span style="float:right">1時間30分</span>
⑤	生食 50mL <span style="float:right">10分フラッシュ</span>

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
アービタックス(初回)	400mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
アービタックス(2回目以降)	250mg/m <sup>2</sup>	mg/Body
カンプト	100mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

○アービタックス投与中又は24時間以内にinfusion reactionが起こる場合があるので注意すること。

○アービタックスは1コース目の初回のみ400mg/m<sup>2</sup>で投与。それ以降は250mg/m<sup>2</sup>で投与。

○カンプトは腸閉塞傾向の患者には禁忌。