

ゼローダ+ランダ(持続)療法 (Day3)

【外科】97-3【胃癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	16	~21
施行日	/	/	/		
ゼローダ	休薬	経口: Day2(夕)~Day16(朝)			
ランダ	休薬	↓	休薬		

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
前日より	前日より持続点滴
①	ソルデム3A 500mL 6時間
②	ソルデム3A 500mL 6時間
③	ソルデム3A 500mL 6時間

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ランダ	80 mg/m ² mg/Body
ゼローダ	2000mg/m ² /分2

■注意・確認事項

○腎毒性を予防するため投与日を含む前後日はハイドレーションを行うこと。

○ゼローダは2週投与1週休薬

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday3,4,5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday2,3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師