

Weeklyランダ+RT療法(腎保護用)(Day1)

【婦人科】92-1【子宮頸癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 1週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	~7
施行日	/	/	/	/	
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	生食 500mL 1時間
②	KCL注20mEq 硫酸Mg補正液1mEq/mL 8mL 生食 500mL 1時間
③	アロカリス注235mg 1V パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 生食 100mL 30分
④	マンニトールS 300mL 1時間
⑤	●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間30分
⑥	ヴィーン3G 500mL 1時間30分 終了時へパロック

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ランダ	40 mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

○腎機能に応じたランダの減量・中止基準: CCr30-60mL/分は50%減量、CCr30mL/分未満は中止とする。

ただし、主治医の判断にて必要な場合にはその限りではない。

入力 薬剤師	看護師	看護師